

# 妊娠線 (肉割れ)

妊娠線 (肉割れ) とは、妊娠や急激な体重増加による皮膚の過進展により引き起こされる結合組織 (コラーゲン) の断裂と癒痕化です。以前は治療方法がなく、進行を遅らせる外用薬しかありませんでしたが、最近ではコラーゲンに熱エネルギーを加えて再生を促してある程度改善していくことが可能となっております。当院では genesis(cutera 社製 long-pulsed YAG laser) の 2 ~ 4 週間ごとの複数回照射をいたします。施術は顔面全体の面積で初回 14000 円、時間は 10 分程度です。シミのレーザー治療後のように入浴制限や軟膏塗布・テープ貼付は必要ありません。

## 妊娠線・肉割れは、めずらしいことではありません・・・しかし大問題なのです

だれでもストレッチマークができる可能性があります、男性よりも女性でよくみられます。ストレッチマークは・・・



# SiDerm

- 年齢を問わず、女性の 70%、男性の 40% でみられます
- 妊娠している女性の 90% でストレッチマークができるため、妊娠中の女性にとっては問題となります

## SilDerm TM Repair Cream



- ストレッチマークの赤みを抑え、くぼみを改善するということが臨床的に証明されているのは、**SilDerm TM Repair Cream** だけです。
- ストレッチマーク治療を専門とする医師により開発されたクリームで、臨床的に有効性が証明されている成分を使用しています。
- 他の治療と異なり、特有の組成によってストレッチマークの赤みやくぼみを軽減する効果があることが証明されています。
- SilDerm TM は、妊娠中でも安心してご使用いただけます。
- 1日2回塗布するだけです。

## ストレッチマークができる原因

### ■妊娠

妊娠中、特に6ヶ月目以降は、ストレッチマークが非常にできやすくなります。出産に備えて靭帯を柔らかくするために体で作るホルモンが、皮膚の線維細胞もやわらかくするため、ストレッチマークができやすくなるのです。

### ■急速な体重増加

短期間に体重が大幅に増加した場合、ストレッチマークができやすくなります。規則正しい食生をしていた後、急速に体重が増えた場合、ストレッチマークができる主な原因となります。

### ■思春期

